

WYTYCZNE

GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA PRODUCENTÓW DROBIU PRZEZNACZONEGO DO ODNOWY POPULACJI ZWIERZINY ŁOWNEJ

**Nr GIWz.400-AI-14/07
z dnia 29 stycznia 2007r.**

Styczeń 2007

Cel wytycznych:

Mając na względzie ujednoczenie postępowania Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie dobrych praktyk bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach hodujących drób przeznaczony do odnowy populacji zwierzyny łownej w odniesieniu do handlu wewnątrzspółnotowego, Główny Lekarz Weterynarii wydał poniższe wytyczne w oparciu o decyzję Komisji Nr 2006/605/WE.

Zaleca się:

- Przechowywanie ptaków w zamknięciu lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
- Karmienie i pojenie w pomieszczeniach zamkniętych do których nie mają dostępu dzikie ptaki;
- Szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przechowywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- Każda zagroda powinna być przeznaczona tylko dla jednego gatunku zwierząt do odnowy populacji;
- Odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
- Zgłaszanie lekarzowi weterynarii zaobserwowanego spadku spożycia paszy lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
- Ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
- Uniemożliwienie dostępu do budynków i wybiegów ssakom domowym i dzikim poprzez zainstalowanie odpowiednich ogrodzeń;
- Sprawdzenie czy osoby obsługujące fermę nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach;
- Rozłożenie przed wejściami do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
- Założenie słuz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu;
- Obowiązek używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie, po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej w szatni;
- Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów i po wyjściu z obiektów, w których utrzymuje się drób;

- Przeprowadzenie deratyzacji całego gospodarstwa hodowlanego wraz z pomieszczeniami do magazynowania ściółki i paszy;
- Przeprowadzenie przynajmniej raz do roku czyszczenie i dezynfekcje sprzętów stosowanych w hodowli oraz każdego budynku i zagród;
- Składowanie zużytej ściółki w sposób uniemożliwiający zwierzętom pośredni kontakt z nią oraz jak najszybsze usunięcie jej z miejsca hodowli;
- Przewożenie ptaków przeznaczonych do sprzedaży wyłącznie w jednorazowych skrzyniach/opakowaniach lub skrzyniach wyprodukowanych z materiałów łatwo podlegających czyszczeniu i dezynfekcji;
- W przypadku hodowli kaczek w okresie 1 czerwca do 30 września, gdy ryzyko zarażenia zwierząt dziko żyjących wysoko zjadliwym wirusem grypy ptaków może być uznane za słabe i w miarę jak poziom ryzyka epidemiologicznego jest oficjalnie uznany za niski dozwolone jest usunięcie siatek z wybiegów oraz miejsc prowadzących do zbiorników wodnych.


Ponadto podmioty hodujące drób przeznaczony do odnowy populacji zwierzyny łownej w ramach handlu wewnątrzspółnotowego w oparciu o Art.4 decyzji Komisji 2006/605/WE powinny spełnić następujące warunki:

- Wysyłka zwierząt jest możliwa wówczas, gdy przeprowadzone badanie serologiczne, w ciągu dwóch miesięcy przed wysyłką, dało wynik ujemny na obecność wirusa grypy ptaków podtypów H5 i H7 oraz zostało przeprowadzone każdorazowo na próbkach pobranych wrywkowo ze stada pochodzenia, z którego ma być sporządzona przesyłka według następujących zasad:
 - 50 próbek w przypadku kaczek lub gęsi lub
 - 20 próbek w przypadku innego drobiu
- Pobranie próbki w ramach badań lub nadzoru na poziomie krajowym są uznawane za wystarczające i otrzymane wyniki , jeśli są negatywne, mogą zwolnić hodowcę od kontroli, określonej powyżej, w okresie dwóch miesięcy od daty pobrania próbek.
- Po upływie dwóch miesięcy od pobrania próbek musi zostać przeprowadzona kolejna kontrola, jeśli hodowca będzie chciał wysłać nową partię ptaków do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
- W przypadku, gdy w trakcie wysyłki zwierzęta będą miały poniżej jednego miesiąca życia, muszą one zostać poddane badaniu wirusologicznemu w kierunku grypy

ptaków poprzez izolację wirusa lub PCR na 20 wymazach ze steków i 20 wymazach z tchawicy lub jamy ustno-gardłowej drobiu, na tydzień przed terminem wysyłki.

- Próbki muszą zostać przesłane do laboratorium referencyjnego (PIW-PIB Puławy).
- Wysyłka zwierząt mających poniżej jednego miesiąca życia może nastąpić wówczas, gdy wyniki przeprowadzonych badań nie wykażą obecności wirusa grypy ptaków podtypu H5 lub H7 oraz muszą zostać spełnione pozostałe warunki (badanie serologiczne o wyniku negatywnym przeprowadzone w okresie krótszym niż dwa miesiące poprzedzające datę wysyłki i zachowanie środków bezpieczeństwa biologicznego).

GLÓWNY LEKARZ WETERYNARII



dr n. Wet. Ewa Lech